



ILICTODIA	MATHDAL		
HIS I UKIA	NAIUKAL	DE LA	ENFERMEDAD

DIABETES MELLITUS TIPO II

PERIODO PREPATOGÉNICO Características: enfermedad crónica en la cual la persona no produce suficiente Periodo de latencia: 3.2 y 13.1 años. insulina o es resistente a esta. Agente: Diabetes Mellitus tipo 2

Huésped: Mujer con sobrepeso de 65 años con antecedentes familiares de

diabetes.

Medio ambiente: cuerpo que no puede producir insulina suficiente para controlar los niveles de azúcar en la sangre.

PERIODO PATOGÉNICO

Etapa subclínica

Cambios tisulares: Equimosis, nicturia y sobrepeso.

Etapa clínica

Signos y síntomas inespecíficos: astenia, disuria, xerosis, infecciones constantes.

Signos y síntomas específicos: Hipermetropía, heridas que tardan en sanar, hiperglucemia, polidipsia.

Defecto o daño: Insuficiencia renal, problemas de la piel, daño ocular, perdida de dientes, infecciones graves.

Muerte

NIVELES DE PREVENCIÓN

PREVENCIÓN PRIMARIA		PREVENCIÓN SECUNDARIA			PREVENCIÓN TERCIARIA
Promoción a la salud	Protección especifica	Diagnostico precoz	Tratamiento oportuno	Limitación del daño	Rehabilitación
 Realiza actividad física. Alimentación balanceada. Acudir a revisión médica. Brindar a la población información sobre como 	 Dieta especifica. Llevar un control de la glucemia. Promover a la población el programa de prevención contra diabetes. 	 Pruebas de laboratorio: A1C Tomar el nivel de glucosa en sangre en ayunas y dos horas después de cada comida. 	 Realizar dieta. Realizar ejercicio. Toma de medicament os o inyección de insulina (según considere el medico). 	 Mantener los niveles de glucosa en sangre próximos a la normalidad. Educación sobre el estilo de vida 	 Apoyo psicológico y social Medidas higiénico-dietéticas y farmacológi cas.



PLAN DE ENSEÑANZA CLÍNICA EN LA PRÁCTICA



p	pueden	 Mantener el
	contraer una	peso
е	enfermedad	corporal adecuado.